

1	ସହେବି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭେଣ୍ଟି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରନଏଫ, ୧୦କି.ଗ୍ରା./ ଏକର ହିସାବରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 7064 Advisory Date :-4/26/2017 10:17:12 AM
2	ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପୋଖରୀରୁ ସମସ୍ତ ମାଛ ଧରାଯିବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ଚାଷ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ହଲକରି ଏକର ପିଛା ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1003 Advisory Date :-4/26/2017 10:25:41 AM
3	ଖରା ଦିନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ୫୦ ଭାଗ ଅଧିକ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି. ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍କାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁହାଳରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-4/27/2017 8:57:32 AM
4	ଭେଣ୍ଟି ଫସଲରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ଇମାମେକ୍ଲିନବେନଡୋଏଟ ୫ଏସ. ଜି. (ପ୍ରକ୍ଲେମବାମିସାଇଲ) @ ୨ ଗ୍ରାମକୁ ନିମ୍ନ ତେଲ ୩୦୦୦ ପି.ପି.ଏମ. @ ୪୫ମି.ଲି. ସହ ୮-୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-5/6/2017 8:13:10 PM
5	ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଧଳା ଝାଡା ହେଉଥିଲେ ବା ଘୁମାଉଥିଲେ ଟେଟ୍ରାସାଇକଲୋନ ୫୦୦ ମିଲି ଗ୍ରାମ ୧/୨ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-5/6/2017 8:19:19 PM
6	ଛେଳି ମେଣ୍ଟାଙ୍କ ଠାରେ ଅନଶୁଦ୍ଧାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ ଓ ଲୋମ କମ ଥିବା ଅଂଶରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିବା ଭବିତ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-5/20/2017 8:38:10 PM
7	ଭେଣ୍ଟି ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛର ଦମନ ନିମନ୍ତେ ହେକଟର ପ୍ରତି ୧୦ ଟି ହଲଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7078 Advisory Date :-5/20/2017 8:44:02 PM
8	ଶିକାରୀ ଓ ଅଦରକାରୀ ମାଛର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ୧ ଏକର ପୋଖରୀରେ ୮୦୦ କି.ଗ୍ରା. ମହୁଲ ପିଡିଆ ବା ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦିନକ ପରେ ୭୦ କି.ଗ୍ରା. ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ପାଉଡର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-5/20/2017 8:55:07 PM
9	ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷଜମିରୁ ନମୁନା ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା କୃଷି ବିଭାଗରେ ପରିକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ତିକା କାର୍ତ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3178 Advisory Date :-5/26/2017 10:58:40 AM
10	ଛତୁ ବେଡ଼ରେ ଦିନକୁ ୨ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ଛତୁ ଘର ଚଟାଣରେ ବାଲି ପକାଇ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4781 Advisory Date :-5/26/2017 11:04:56 AM
11	କୁକୁଡ଼ା ଘର ଚଟାଣରେ ଲିଟର ୬ ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. ମୋଟା ଲିଟର ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 7076 Advisory Date :-5/26/2017 11:10:55 AM
12	ଧାନ କିସମ ୧୦୦୧୧ ପିଣ୍ଡ ବିହନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳରେ ଉପଲବ୍ଧ. ଇଛୁକ ଚାଷୀମାନେ ବିହନ କିଣିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7075 Advisory Date :-6/3/2017 9:39:44 AM
13	୧ କି.ଗ୍ରା. ସୋଡିଅମବାଇକାର୍ବୋନେଟ ୧ ଟନ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହିଟଷ୍ଟୋକ କମିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ.

	Total No of Farmer : - 3178 Advisory Date :-6/3/2017 9:45:46 AM
14	ଜୁନ ମାସରେ ଚୂନ ପକାଇବାର ୭-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବର ଏକର ପିଛା ୫୦୦୦-୧୦୦୦୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଓ ଆମନିୟମ ସଲଫେଟ ୫୦ କି.ଗ୍ରା., ସୁପରସାର ୪୫କି.ଗ୍ରା. ଓ ପଟାସିଆମ ନାଇଟ୍ରେଟ ୮ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 999 Advisory Date :-6/3/2017 9:53:32 AM
15	ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସାହାଣ ବା ଗଳା ଫୁଲା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଶୀତ ଦିନର ୧୫ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଟୀକା ନେବା ଉଚିତ.
	Total No of Farmer : - 3178 Advisory Date :-6/8/2017 5:57:55 PM
16	କଖାରୁରେ ଫଳ ମାଛି ଦମନ ପାଇଁ ବିଷ ଥୋପ (୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ଗୁଡ଼ ଓ ୨୦ ମି.ଲି. ଡାଇକ୍ଲୋରୋଡାଇଫ୍‌ସିଗାଲ) ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ।
	Total No of Farmer : - 4780 Advisory Date :-6/8/2017 6:11:22 PM
17	ଦିନ ଓ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଆର୍ଥିକ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଥାଇୟୋମେଥଲ୍‌ସିଆମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7065 Advisory Date :-6/8/2017 6:15:55 PM
18	ତିନି ବର୍ଷରୁ କମ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ବଜବଜିଆ ଟୀକା ବର୍ଷକୁ ୨ ଥର ଯଥା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବା ଉଚିତ. ପ୍ରତି ଥର ପ୍ରଥମ ଟୀକା ଦିଆଯିବାର ଠିକ ୧୦ ଦିନ ପରେ ଏକ ବୁଷ୍ଟାର ଟୀକା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ. ନଚେତ ଟୀକା କାମ କରେ ନାହିଁ.
	Total No of Farmer : - 3178 Advisory Date :-6/13/2017 10:12:33 AM
19	ବୁଣା ଧାନରେ ଘାସ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ବତର ଥିଲେ ବୁଣିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର ବୁଟାକ୍ଲୋର ବା ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଅକ୍ସାଡାଇଜର୍‌ଲ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ବାଲିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7076 Advisory Date :-6/23/2017 10:35:45 AM
20	ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ. ଏହି ପାଣି ପୋଖରୀରେ ମିଶିଲେ ପାଣିର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବଢ଼ିଥାଏ. ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୧୦୦ କେ.ଜି. ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1000 Advisory Date :-6/23/2017 11:52:15 AM
21	ବର୍ଷାଦିନେ ଛେଳିମାନେ ପି.ପି.ଆର. ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି. ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଓ ନିମୋନିଆ. ତେଣୁକରି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ. ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-6/23/2017 12:00:13 PM
22	ବୁଣା ଧାନରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫ ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ , ୩୦ କି.ଗ୍ରା ପଟାସ୍ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7078 Advisory Date :-6/30/2017 11:02:35 PM
23	ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଛେଳିମାନେ ସାହାଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମରିଯାନ୍ତି. ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସାହାଣ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3181 Advisory Date :-6/30/2017 11:13:16 PM
24	ଗୋବର ଛତୁର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଥିବା ଖରିଫ ଧାନର ନଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ଛତୁ ବେଡ଼ରେ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଗୋବର ଛତୁ ଦେଖାଗଲେ ହାତରେ କାଢ଼ି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4784 Advisory Date :-6/30/2017 11:27:29 PM
25	ଗୁଣ୍ଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଟ୍ରାକଟର ଚାଳିତ ରୋଗାଭେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ସବୁପ୍ରକାର ଫସଲରେ ଧାଡ଼ି ବୁଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଓ ସାର ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ଧାଡ଼ିରେ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତ୍ୱଯୁଗଚାଳିତ ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.

	Total No of Farmer : - 7079 Advisory Date :-7/6/2017 5:26:38 AM
26	ପୋଖରୀରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହୋଇ ଏକ ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଗଲା ପରେ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀରେ ଏକର ପିଛା ୨୦୦୦ କେ.ଜି. କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ନୂଆ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ପୋଖରୀରେ ୩୦୦୦ କେ.ଜି.ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-7/6/2017 5:37:42 AM
27	ବାଉଁଶ ପବରୁ ଚାରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷର ବାଉଁଶ କାଟି ପବରେ ଛିଦ୍ର କରି ଓ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7067 Advisory Date :-7/6/2017 5:43:43 AM
28	ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏକର ପିଛା ୪୦୦୦ ମିଶ୍ରିତ ଜାଆଁଳ (୨୦-୪୦ ମି.ମି.) ବା ୨୦୦୦ ମିଶ୍ରିତ ବଡ଼ ଜାଆଁଳ (୪୦-୬୦ ମି.ମି.) ୩୦:୪୦:୩୦ ଅନୁପାତରେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-7/14/2017 12:44:18 PM
29	ଧନିଚା ଓ ଛଣି ସବୁଜ ସାରକୁ ଜମିରେ ହଳକରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ. ମିଶାଇବା ବେଳେ ହେକ୍ଟରକୁ ୨୦ କେ.ଜି. ୟୁରିଆ ସାର ପକାଇଲେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ପଚିଯିବ.
	Total No of Farmer : - 7077 Advisory Date :-7/14/2017 1:47:40 PM
30	ଦୁଗ୍ଧ ଜ୍ୱର ନ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ୫ ମାସ ପର ଠାରୁ ୯ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ ଦିନକୁ ୩୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦାନାରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ. ଏହା ସହିତ କ୍ୟାଲସିଅମ ଟନିକ ଦିନକୁ ଥରେ କରି ନବମ ମାସରେ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-7/14/2017 1:56:09 PM
31	ଉନ୍ନତ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଚାରା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4783 Advisory Date :-7/21/2017 12:53:13 PM
32	ଧାନ ତଳି ଘରାରେ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨ ମି.ଲି. ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7067 Advisory Date :-7/21/2017 12:57:31 PM
33	ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା- ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରିରେ ଘାସ ନ ଭଠିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ଇମାଜିଥାପିର୍ କିମ୍ବା କ୍ୱିଜାଲୋଫୋସ୍ ଇଥାଇଲ୍ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ବାଲିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7077 Advisory Date :-7/25/2017 10:35:10 AM
34	ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କସ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେବା ସହ ପରିସ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛେଳିମାନେ ନିରୋଗ ରହିବେ.
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-7/25/2017 11:30:13 AM
35	ଶାଗୁଆନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାରା ତିଆରି କରିଥିବା ପଟାଲିରୁ ଉପାଡ଼ି ବୁଢ଼ା ଆଖୁଠି ମାପର ଚାରକୁ କାଟି ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7066 Advisory Date :-7/26/2017 12:37:38 PM
36	ବର୍ଷା ଦିନ ଶେଷରେ ଗୋଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-8/1/2017 12:12:51 PM
37	ଯାଆଁଳା ଛାଡ଼ିବାର ମାସେପରେ ଏକର ପିଛା ପୁରୁଣା ପୋଖରୀରେ ୩୦୦କେ.ଜି ଓ ନୂଆ ପୋଖରୀରେ 500କେ.ଜି କଞ୍ଚା ଗୋବର ଓ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀରେ ଏମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ୫କେ.ଜି ଓ ସୁପର ୫କେ.ଜି ଓ ନୂଆ ପୋଖରୀରେ ୟୁରିଆ ୪କେ.ଜି ଓ ସୁପର ୮କେ.ଜି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-8/1/2017 12:27:53 PM

38	ଧାନ ତଳିଘରାରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଡେସିମିଲ୍. ପାଇଁ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫୋରେଟ୍ କିମ୍ବା ୧୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଶାଜି କିମ୍ବା କାର୍ଗାଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪୫୫ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାନାଦାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ .
	Total No of Farmer : - 7076 Advisory Date :-8/1/2017 12:33:06 PM
39	ରୁଆ ଧାନରେ ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ରୋଇବାର ୩-୪ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ବେନସଲଫ୍ୟୁରୋନ୍ ଓ ପ୍ରିଡିଲାଇକ୍ଲୋର କିମ୍ବା ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପାଇରାଜୋ ସଲଫ୍ୟୁରୋନ୍ ଇଆଇଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7076 Advisory Date :-8/9/2017 10:53:17 AM
40	ଛେଲି ମେଣ୍ଟାଙ୍କଠାରେ ପି.ପି.ଆର. ରୋଗ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ଟୀକା ୩ ମାସ ବୟସରେ ଦେବା ଉଚିତ.
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-8/9/2017 10:56:22 AM
41	ମକା ଓ ହରଡରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୋଡାଖୁସା କରି ଶୀର୍ଷ ସାର ଦେଇ ମୂଳକୁ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7062 Advisory Date :-8/10/2017 5:31:21 PM
42	ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗରେ ମୁଗ, ବିରି ଓ ଭେଣ୍ଟିରେ ଫସଲରେ ସାହେବୀ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଆଇୟୋମେଥାକ୍ସାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7066 Advisory Date :-8/17/2017 3:56:52 PM
43	ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଘାସ ଚାଷ କରି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସବୁଜ ଘାସ ଓ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ଗୁହାଳକୁ ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ସହିତ ରୁନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-8/17/2017 4:06:22 PM
44	ଯାଆଁଳା ଛାଡିବା ଠାରୁ ମାଛ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଓଲି କୃତ୍ରିମ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବାଦାମ ପିଡିଆ ଓ କୁଣ୍ଡାର ମିଶ୍ରଣକୁ ୧:୧ ଅନୁପାତରେ ମାଛ ଶରୀର ଓଜନର ୩-୨ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ, ୩ମି.ଲି. କଡ଼ ମାଛର ତେଲ, ୧୦ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-8/17/2017 4:25:51 PM
45	ଫାଗୁଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ପାଟି ଓ ଖୁରାରେ ହୋଇଥିବା ଘା କୁ ୧% ପଟାଶିଆମ ପରମାଂଗାନେଟ ର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3181 Advisory Date :-8/22/2017 4:06:50 PM
46	ଏକର ପିଛା ୧୨୦୦ ମୁଣ୍ଡା ଜାଆଁଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବାରମ୍ବାର ଅମଳ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୁଲାଇ ରୁ ସେଫ୍ଟେମ୍ବର (ପ୍ରଥମ), ଅକଟୋବର ରୁ ଜାନୁଆରୀ (ଦ୍ୱିତୀୟ) ଓ ଫେବୃଆରୀ ରୁ ଏପ୍ରିଲ (ତୃତୀୟ), ଏପରି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଥର ଅମଳ କରି ପାରିବେ.
	Total No of Farmer : - 1002 Advisory Date :-8/22/2017 4:16:11 PM
47	ପନିପରିବା ରେ ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ୧ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ Mancozeb ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7067 Advisory Date :-8/22/2017 4:28:24 PM
48	ଘାସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଲେ ଧାନ ରୋଇବାର ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୮୦ ଗ୍ରାମ ପାଇରାଜୋସଲଫ୍ୟୁରନ୍ ଇଆଇଲ୍ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7076 Advisory Date :-8/30/2017 6:52:29 AM
49	ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ଥିବାରୁ ପନିପରିବାରେ ଶୋଷକ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7080 Advisory Date :-8/31/2017 12:19:08 PM
50	ଗର୍ଭସ୍ଥ ଗାଈକୁ ୫ ମାସ, ୬ ମାସ ଓ ୮ ମାସରେ ୩ ଥର ଭିଟାମିନ-କ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିଥର (୬୦୦୦୦୦ ଆଇ.ୟୁ) ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାରକଣା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ହେବ.

	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-8/31/2017 12:51:14 PM
51	ପାଳ ଛତୁ ଚାଷରେ ବର୍ଷାଦିନେ ହେଉଥିବା କଢ ପତା ରୋଗ ପାଇଁ ଫିମି ମାଡି ଚଣା ଆକାରର ଛତୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ଛତୁ ବେଡ଼ର ପଲିଥିନକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4781 Advisory Date :-9/6/2017 12:41:35 PM
52	ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଗାଈକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦାନା ଦେଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ. ଯଥା: ପ୍ରତି ୨ଲି. କ୍ଷୀର ପାଇଁ ୧କିଗ୍ରା, ନିଜର ବଂଚିବା ପାଇଁ ୧.୫ ରୁ ୨କିଗ୍ରା ଓ ୬ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଗାଈକୁ ୧ କିଗ୍ରା ଅଧିକ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-9/6/2017 12:54:01 PM
53	ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ପତ୍ରଖିଆ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7079 Advisory Date :-9/6/2017 12:56:12 PM
54	ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଭେଣ୍ଟିରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି. ନିମ୍ଫୁ ତେଲ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7079 Advisory Date :-9/13/2017 3:36:48 PM
55	ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଘାସ ଚାଷ କରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସବୁଜ ଘାସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ. ଗୁହାଳକୁ ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ସହିତ ରୁନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-9/13/2017 3:40:16 PM
56	ବର୍ଷା ଦିନିଆ ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଫୁଲ ଧରିବା ବେଳେ ବାୟୁଆ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ. ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ କିରାସିନେ କିମ୍ବା ସରଫ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7079 Advisory Date :-9/14/2017 12:37:34 PM
57	ଛତୁ ଘରର କାନ୍ଥ, ଚଟାଣ, ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାରକୁ ଫେନବାଲେରେଟ କିମ୍ବା ଡେକାମେଥ୍ରୀନ ୦.୦୫ % ହାରରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ପରିଚାଳନା କରା ଯାଇ ପାରିବ.
	Total No of Farmer : - 4781 Advisory Date :-9/22/2017 3:23:54 PM
58	ଧାନର କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ଟି ଫେରମନ ଗ୍ରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ଅଣ୍ଡା ପରଶ୍ରୟା କୀଟ ୧୦ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ଥର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓ କାର୍ବେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ୧୦କେଜି ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7079 Advisory Date :-9/22/2017 3:45:52 PM
59	ଛେଳି ମେଣ୍ଟା ରହୁଥିବା ଘରକୁ ପରିସ୍କାର କରି ଟିଙ୍କ ନିବାରଣ ମେଡ଼ିସିନ ପୋଷ୍ଟଜେନ / ପେକଟୋସାଇଡ / ଟିକ୍ସାଉଟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-9/22/2017 4:06:13 PM
60	ଧାନରେ ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନଟୋମାଇସିନ ଓ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକଲୋରାଇଡ଼ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7066 Advisory Date :-9/25/2017 3:44:32 PM
61	ଜୁନ ମାସରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସବୁଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଘାସ ଯଥା: Hybrid Napier, ବାଜରା, ଗିନି ଘାସକୁ ଜମି ପଞ୍ଚନରୁ ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ କଟା କରି ଗୋଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ଏକର ପ୍ରତି ୧୨କେଜି ଜୀବଖରାଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଡ଼ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-9/25/2017 4:22:19 PM
62	ଶୁଖିଲା ପାଗ ଥିଲେ ରାଶି ଫସଲରେ ବିହାରୀ ସାମ୍ବଲୁଆ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.

	Total No of Farmer : - 7080 Advisory Date :-10/7/2017 10:19:20 AM
63	ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ହରଡ଼ କିଆରିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 12712 Advisory Date :-10/7/2017 10:39:58 AM
64	କୁନ୍ଦୁରି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କେ.ଜି. ଜବକ୍ଷାରଜନ, ୧୨ କେ.ଜି. ଫସଫରସ, ୮ କେ.ଜି. ପଟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4781 Advisory Date :-10/17/2017 1:58:52 PM
65	ବ୍ର-ଏଲର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦେବାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଓ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 3180 Advisory Date :-10/17/2017 2:04:42 PM
66	ଶୀତଦିନେ ପଲିଥିନ ଘରେ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ଛତୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ. ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-10/18/2017 10:11:05 AM
67	ଶୀତଦିନିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ଚାରି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ. ତଳି ଘରାରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୧ କେ.ଜି. ବିହନକୁ ୧ ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭାଲ୍ସ '୦' ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-10/26/2017 10:08:38 AM
68	ଧାନ କ୍ଷୀର ଢେକିଲାବେଳେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି. ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ମିଲି ହିସାବରେ ମାଲଥିଅନ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7080 Advisory Date :-10/26/2017 10:12:11 AM
69	ପନିପରିବାରେ ବୀଜାଣୁଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେପଟସାଇକ୍ଲିନ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୂଳ ଭିଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4771 Advisory Date :-10/27/2017 1:20:05 PM
70	କଖାରୁ, ଜନହି, କାକୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଫଳ ମାଛି ଦମନ ପାଇଁ ୧ ମି.ଲି. ମଲାଥୀଆନ ସହିତ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷ ଥୋପ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-10/31/2017 3:07:20 PM
71	ମଝିଆଳି ଖାଲ ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବାର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମିରେ ବୁପୁରୁପିଆ ପାଣିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର, ମଟର, ଚଣା, ସୋରିଷ ଆଦି ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7077 Advisory Date :-10/31/2017 3:12:38 PM
72	ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଫ୍ଲୋନିକମାଇଡ ୬୦ଗ୍ରାମ/ ଡାଇନୋଟେଫୁରାନ ୮୦ଗ୍ରାମ/ପାଇମେଟରୋଜିନ ୧୨୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ହସ୍ତଚାଳିତ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ୨୦୦ଲି. ଓ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ୬୦ଲି. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 12713 Advisory Date :-11/7/2017 12:29:29 PM
73	ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅମଳ ଫସଲକୁ ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲେ ୨% ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ (୨୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ୧ ଲି. ପାଣିରେ)କୁ ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ଏହାଦ୍ୱାରା କିଆରିରେ ଧାନ ଗଜା ହୋଇ ନଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 12712 Advisory Date :-11/13/2017 1:19:28 PM
74	ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଫସଲ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଠାରେ ପାହି କରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7075 Advisory Date :-11/13/2017 1:26:12 PM

75	କୋବି ଫସଲକୁ ଧୁଆଁ ଗୋଟି ପୋକର ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ୫ ମି.ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ତନୋତ୍ପାଦ ୭ ମି.ଲି. ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-11/13/2017 1:44:03 PM
76	ଲଙ୍କାର ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନର୍ସରୀକୁ ପଲିଥିନରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳି ଘରାରେ କାଷ୍ଠାନ ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4771 Advisory Date :-11/21/2017 4:17:34 PM
77	ବାଇଗଣରେ ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ୪ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଵାଇନୋସାଡ୍ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-11/22/2017 4:27:59 PM
78	ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକର/ ମିଟର ପିଛା ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କେ.ଜି. ଚୂନ ୩ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୩ ଥର କିମ୍ବା ସିଫାକ୍ସ ୪୦୦ ମି.ଲି. ଏକର/ ମିଟର ଜଳଭାଗ ପିଛା ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-11/22/2017 4:35:38 PM
79	ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରୁ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଚିନାବାଦାମ ଓ ଭାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ବୁଣାବୁଣି ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7074 Advisory Date :-11/30/2017 11:19:05 AM
80	ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଦିପ ଜମିରେ ଧାନ କିମ୍ବା ଅଣଧାନ ପରେ ରସୁଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶୀଘ୍ର ଲଗାଇ କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-11/30/2017 11:25:16 AM
81	ଚିକ୍ଳୁଡ଼ିରାଷ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରତେକ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଏକର ପିଛା ଡୋଲାମାଇଟ ୨୦କି.ଗ୍ରା ଓ ଏହାର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୁରିଆ ୪କି.ଗ୍ରା ଓ ସୁପର ସାର ୮କି.ଗ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ପୋଖରୀତଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହେଲେ ଜିଓଲାଇଟ ଏକର ପିଛା ୪୦ - ୮୦କି.ଗ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 1001 Advisory Date :-11/30/2017 11:44:39 AM
82	ପିଙ୍ଗିରି ଛତୁକୁ ପରିସ୍କାର ଭାବରେ ସଫା କରି ୦.୦୫% ପୋଟାସିୟମ ମେଟାବାଇସଲଫାଇଟ ଏବଂ ୦.୧% ସାଇଟରିକ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡାଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପଲିଥିନ ପ୍ୟାକରେ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ.
	Total No of Farmer : - 4781 Advisory Date :-12/6/2017 12:48:27 PM
83	କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ରାତିରେ ପଲିଥିନ କିମ୍ବା ଅଖାରେ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ. ଘର ବାଡ଼ିରେ ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଣ୍ଡାଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3179 Advisory Date :-12/6/2017 12:52:30 PM
84	ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅମଳ ଫସଲକୁ ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇ ପାରୁନଥିଲେ କିଆରୀରେ ଧାନ ଗଜା ନହେବା ପାଇଁ ୨% ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ (୨୦ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ୧ଲି. ପାଣିରେ) ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ଧାନ ଫସଲ ପଡିଯାଇଥିଲେ ପାହିକରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 12710 Advisory Date :-12/7/2017 2:19:28 PM
85	ବୁଟ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଓ ୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡିମି ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ. ଏହାର ୬ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିଅମ କଲଚରରେ ବିହନକୁ ଗୋଳାଇ ବୁଣନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7074 Advisory Date :-12/12/2017 3:51:29 PM

86	ଗୋଲାପ ଚାଷ ପାଇଁ ନିଗିଡ଼ା ଉର୍ବର ଦୋରସା ମାଟି ଏବଂ ଅମ୍ଳତା ୭.୦ ରୁ ୭.୫ ରହିଥିବା ଜମିରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4782 Advisory Date :-12/12/2017 3:55:02 PM
87	ପନିପରିବାରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4772 Advisory Date :-12/13/2017 3:47:06 PM
88	ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ଛୁଇଁ ବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋକ୍ସିକାର୍ବ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ମି. ଲି . ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7077 Advisory Date :-12/22/2017 12:43:07 PM
89	ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫୁଲକୋବିରେ ଶୋଷକ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ ଏକର ପିଛା ୧୨୦ ଗ୍ରା. ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4781 Advisory Date :-12/22/2017 12:45:20 PM
90	ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାଛରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ରୁପସି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଗ୍ରା. ପୋଟାସିଅମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ ଦ୍ରବଣ କରି ମାଛକୁ ୫ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1000 Advisory Date :-12/22/2017 12:51:49 PM
91	ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଭେଣ୍ଟିରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି. ନିମ୍ବୁ ତେଲ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4817 Advisory Date :-12/28/2017 4:45:43 PM
92	ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ଔଷଧ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ମି. ଲି. ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7113 Advisory Date :-12/28/2017 4:48:01 PM
93	ଶୀତ ଦିନିଆ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏକର ପୋଖରୀ ପାଇଁ ୪୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୪୦୦ ମି .ଲି . Cifax ଔଷଧ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 1043 Advisory Date :-12/28/2017 4:50:06 PM
94	ଜୀବାଣୁ ଦ୍ଵାରା ଛତୁର ନାଡ଼ ଓ ଦୁଇ କଡ଼ ହଳଦିଆ ଓ ପରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ. ତେଣୁ ଛତୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପାଣି କମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ପରେ ବେଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ହଲାଇ ପାଣି ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ. ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ଛତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ତୋଳି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4818 Advisory Date :-1/5/2018 3:56:57 PM
95	ଶୀତ ଦିନେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ମ ପ୍ଲାନରେ ରଖିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3212 Advisory Date :-1/5/2018 4:01:10 PM
96	ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରି ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଅନୁମୋଦିତ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7125 Advisory Date :-1/5/2018 4:04:47 PM
97	ଶୀତ ଋତୁରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ କୃମି ଓ ବାହ୍ୟ କୃମିର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମୃତୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି. ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3212 Advisory Date :-1/10/2018 12:07:34 PM
98	ଛତୁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୫୦ ମି.ଲି. ଫର୍ମାଲିନ ପକାଇ ସିଞ୍ଚନ କରି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4818 Advisory Date :-1/10/2018 12:15:01 PM
99	ବାଉଁଶ ପବରୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ୨ ବର୍ଷର ବାଉଁଶ କାଟି ପବ ତିଆରି କରି ମଝିରେ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଓ ନରସେରୀରେ ପୋତନ୍ତୁ।

	Total No of Farmer : - 7113 Advisory Date :-1/10/2018 12:23:30 PM
100	ଶୀତଋତୁରେ ବିଶେଷ କରି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ. ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଟୀକାକରଣ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ.
	Total No of Farmer : - 3212 Advisory Date :-1/17/2018 4:49:45 PM
101	ହରଡ଼ରେ ଫଳବିକା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ କିମ୍ବା ୪ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଫୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7113 Advisory Date :-1/18/2018 9:26:49 AM
102	ଭେଣ୍ଟିରେ ସାହେବୀ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ହଳଦିଆ ଅଠାୟୁକ୍ତ ଯତ୍ନା ବସାନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4807 Advisory Date :-1/18/2018 9:31:04 AM
103	ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. ସଲଫର ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୫୦୦ ମି. ଲି. ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7113 Advisory Date :-1/25/2018 10:26:33 AM
104	ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁସମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ. ଏହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦକତା ବଢାଇଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 3212 Advisory Date :-1/25/2018 12:35:06 PM
105	ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ କିମ୍ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7113 Advisory Date :-1/30/2018 11:57:33 AM
106	ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫୁଲକୋବିରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ କିମ୍ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4807 Advisory Date :-1/30/2018 12:09:42 PM
107	ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫୁଲକୋବିରେ ଶୋଷକ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4844 Advisory Date :-2/6/2018 11:04:58 AM
108	ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି. ନିମ୍ଫ ତେଲ (୫୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍.) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7129 Advisory Date :-2/6/2018 11:08:46 AM
109	ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ୧୦% ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 3219 Advisory Date :-2/6/2018 11:12:46 AM
110	ଆଗାମୀ ୧୨ ଓ ୧୩ ତାରିଖରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ତାହା ଭାଇମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ.
	Total No of Farmer : - 12714 Advisory Date :-2/11/2018 8:00:18 AM
111	ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ଓ ପନିପରିବା ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 25 Advisory Date :-2/12/2018 11:56:31 AM
112	ଶିମ୍ଫ ଫସଲକୁ ଜଉ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି. ନିମ୍ଫ ତେଲ (୫୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍.) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

	Total No of Farmer : - 4833 Advisory Date :-3/2/2018 4:17:21 PM
113	ଧାନ ଗଛ ୩୦ ଦିନର ହୋଇଥିଲେ ଅନୁମୋଦିତ ଯବଖାରଯାନ ସାରର ଅଧା ପିଲସାର ଭାବେ (ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ ଯୁରିଆ ଏକର ପ୍ରତି ୪୨ କି.ଗ୍ରା. ଓ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପାଇଁ ୫୨ କି.ଗ୍ରା.) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ.
	Total No of Farmer : - 7140 Advisory Date :-3/2/2018 4:33:51 PM
114	ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଅଖା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3219 Advisory Date :-3/2/2018 4:38:23 PM
115	ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ଇମାଜିଆପିର୍ କିମ୍ବା କ୍ୱିଜାଲୋଫୋସ୍ ଇଆଇଲ୍ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବୁଣିବାର ୨୦ ଦିନ ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7141 Advisory Date :-3/8/2018 11:09:40 AM
116	ମାଛ ଚାଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ପୋଖରୀ ଜଳ ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁଳିଆ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ଏକର ପିଛା ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ରୁନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଛ ପିଛା ୨୪୦ କି.ଗ୍ରା. ରୁନକୁ ୩ ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1046 Advisory Date :-3/8/2018 4:21:20 PM
117	ଦିନବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଗୁହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ । ତାପମାତ୍ରା ବହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 3221 Advisory Date :-3/8/2018 4:41:43 PM
118	ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଳ ଫୁଲ ଓ କଷି ଶୁଖି ଝଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି. ଆମ୍ଳ ଗଛରେ ସାଧା ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4845 Advisory Date :-3/13/2018 4:10:43 PM
119	ଆଖୁ ଫସଲରେ ସଅଳ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦୦୦ ଅଣ୍ଟା ପରଶୁୟା କୀଟ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7121 Advisory Date :-3/13/2018 4:15:48 PM
120	ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗରେ ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି, ପତ୍ର ଡିଆଁ ଓ ପତ୍ର ଉକୁଣି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ. ଆର୍ଥିକ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ୩ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ଆଇସୋମେଥକ୍ସାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7144 Advisory Date :-3/22/2018 11:11:31 AM
121	ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗରେ ବିନରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ତାର ଦମନ ପାଇଁ ୫୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍.ର ନିମତେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4834 Advisory Date :-3/22/2018 11:15:12 AM
122	ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ମାଛ ପାଇଁ ମାଛ ଓଜନର ଶତକଡ଼ା ୧ ଭାଗ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ. ମାଛ ୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ହୋଇଗଲେ ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1045 Advisory Date :-3/22/2018 11:20:31 AM
123	ହରଡ଼ରେ ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୪ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ସ୍ୱାଇନୋସାଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7130 Advisory Date :-3/28/2018 5:23:57 PM
124	ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗରେ ବାଇଗଣରେ ଫଳବିକ୍ଷା ଓ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ । ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିମତେଲ ୩୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4845 Advisory Date :-3/28/2018 5:18:32 PM

