

1	ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗରେ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକର ପିଛା ୧୦ ଗୋଟି ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପ ଲଗାନ୍ତୁ । ଯୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ଲିଟର ପିଛା ୫ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 7145      Advisory Date :-4/4/2018 3:30:14 PM
2	ଭେଣ୍ଟିରେ ସାହେବୀ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକର ପିଛା ୬୦ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4835      Advisory Date :-4/4/2018 3:33:08 PM
3	ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରେ ଭକ୍ତଶିଆ ଯୋଗୁଁ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମାଲ୍ୟିଅନ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4846      Advisory Date :-4/12/2018 2:12:38 PM
4	ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବା ହେତୁ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଓଜନର ୨ ପ୍ରତିଶତ ଖାଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 1046      Advisory Date :-4/12/2018 2:19:01 PM
5	ଫାଗୁଆ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇଁ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 3221      Advisory Date :-4/12/2018 2:27:37 PM
6	ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଭକ୍ତଶି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଆର୍ଥିକ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି. ମଲ୍ଡିନିମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଧଳା ମାଛି ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଡାୟାଫେନଥୀରୋନ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 4845      Advisory Date :-4/17/2018 2:54:28 PM
7	କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତର ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 3220      Advisory Date :-4/17/2018 3:03:08 PM
8	ସାହେବି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭେଣ୍ଟି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରନ ଏଫ, ୧୦କି.ଗ୍ରା./ ଏକର ହିସାବରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 4834      Advisory Date :-4/26/2018 12:12:17 PM
9	ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଫ୍ଲୋନିକମାଇଡ ୬୦ଗ୍ରାମ/ ଡାଇନୋଟେଫ୍ଟୋରାନ ୮୦ଗ୍ରାମ/ପାଇମେଟରୋଜିନ ୧୨୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ହସ୍ତଚାଳିତ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ୨୦୦ଲି. ଓ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ୭୦ଲି. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 7130      Advisory Date :-4/26/2018 11:47:18 AM
10	ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ ଜମିରୁ ନମୁନା ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା କୃଷି ବିଭାଗରେ ପରିକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ତିକା କାର୍ତ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 7142      Advisory Date :-5/2/2018 10:02:09 AM
11	ଭେଣ୍ଟି ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିର ଦମନ ନିମନ୍ତେ ହେକଟର ପ୍ରତି ୧୦ ଟି ହଲଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4845      Advisory Date :-5/2/2018 9:59:15 AM
12	ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଧଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ବା ଘୁମାଉଥିଲେ ଟେଟ୍ରାସାଇକଲୋନ ୫୦୦ ମିଲି ଗ୍ରାମ ୧/୨ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3220      Advisory Date :-5/2/2018 9:56:23 AM
13	ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖିପାରୁ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ପୋଖରୀରୁ ଦଳ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଗ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦଳ ଖିଆ ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1045      Advisory Date :-5/17/2018 11:30:15 AM

14	ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ କଳା ଫିଫି ରୋଗ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ. ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼-ଏଞ୍ଜ ୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4845      Advisory Date :-5/17/2018 11:44:04 AM
15	ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଛତୁ ଘରର ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ସ୍ତ୍ରେ କରିବା ସହ ତଳେ ବାଲି ପକାଇ ପାଣି ଦେଲେ ଛତୁ ଘରର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ.
	Total No of Farmer : - 4845      Advisory Date :-5/19/2018 10:39:32 AM
16	ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳ ସତ୍ତା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ହିସାବରେ ମେଟାଲାଇକସିଲ + ମାଙ୍କଡ଼େବ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 4834      Advisory Date :-5/21/2018 12:20:20 PM
17	ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜମିକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ. ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପୋକର ଶୁକ୍ର ଓ ଅଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି.
	Total No of Farmer : - 7141      Advisory Date :-5/21/2018 12:28:09 PM
18	ଛେଳିମେଣ୍ଟାଙ୍କ ଠାରେ ଅନଶୁ ଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଓ ଲୋମ କମ ଥିବା ଅଂଶରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିବା ଉଚିତ.
	Total No of Farmer : - 3220      Advisory Date :-5/21/2018 1:56:13 PM
19	ଖରାଦିନେ ପୋଖରୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାଆଁଳା ଛାଡ଼ିବାର ୩ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ ୨୫୦୦କି.ଗ୍ରା./ ହେ. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶିକାରୀ ଓ ଅଦରକାରୀ ମାଛର ନିରାକରଣ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1407      Advisory Date :-6/1/2018 4:32:14 PM
20	୧କି.ଗ୍ରା. ସୋଡ଼ିଅମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ ୧ଟନ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ହିଟଷ୍ଟୋକ କମିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 3646      Advisory Date :-6/1/2018 4:37:50 PM
21	ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମି ଯେଉଁଠାରେ ଧାନ ସିଧା ବୁଣାଯାଏ ସେଠାରେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ. ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8198      Advisory Date :-6/1/2018 4:47:35 PM
22	ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମି ପାଇଁ ଧାନ କିସମ ଗାୟତ୍ରୀ, ଶାରଳା, ଉପହାର, ବର୍ଷାଧାନ ଓ ଦୁର୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ଖାଲୁଆ ଜମି ନିମନ୍ତେ ଜଳମଣୀ, ଜୟନ୍ତ୍ରୀଧାନ, ସି.ଆର.ଧାନ-୫୦୦, ସି.ଆର.ଧାନ-୫୦୫ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8197      Advisory Date :-6/6/2018 9:49:03 AM
23	ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ସାହାଣ ବା ଗଳାଫୁଲ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷା ଦିନ ଓ ଶୀତ ଦିନର ୧୫ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ.
	Total No of Farmer : - 3646      Advisory Date :-6/6/2018 10:37:50 AM
24	ଭଜା ଜମି ପାଇଁ ସହଭାଗୀଧାନ, ସତ୍ୟଭାମା, ଅନୁଦା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବନ୍ଦନା, ଅଞ୍ଜଳି ଆଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. ବିହନ ସର୍ବଦା ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୃଷି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8197      Advisory Date :-6/7/2018 12:17:05 PM
25	ଧାନ କିସମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପୂଜା, ସି.ଆର. ଧାନ-୩୦୦, ସୁମିତ, ପ୍ରତିକ୍ଷା, ରାଣୀଧାନ, ସି.ଆର. ଧାନ-୪୦୭ ବର୍ଷାଶ୍ରୀତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8198      Advisory Date :-6/11/2018 3:13:47 PM

26	ବିହନକୁ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାରବେଣ୍ଡ୍ରୀମ ୨୫ ଡବ୍ଲୁ.ପି.ରେ ବିଶୋଧନ କରି ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୨୦ x ୧୫ ସ୍ୱେପ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଧା ବୁଣା କରି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8199 Advisory Date :-6/12/2018 9:07:38 AM
27	କଖାରୁରେ ଫଳମାଛି ଦମନ ପାଇଁ ବିଷ ଥୋପ (୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ ଓ ୨୦ ମି.ଲି. ଡାଇକ୍ଲୋରୋଭସ୍ ମିଶାଇ) ଜମିରେ ରଖନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5532 Advisory Date :-6/12/2018 9:17:53 AM
28	ଜମିରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦମନ, ମାଟିରେ ଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଖରାଟିଆ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଭାବରେ କରି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8198 Advisory Date :-6/19/2018 5:25:58 PM
29	ପୋଟଳର ତେର ସଜା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାନଟୋମାଇସିନ ସହିତ ୨୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ଲାଇଟକସ୍-୫୦ ଦଶ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5521 Advisory Date :-6/20/2018 4:10:22 PM
30	ଜୁନ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ପୁର୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ଧାନର ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ଯଦି ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ସାରିଛି, ତେବେ ଜମିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8199 Advisory Date :-6/20/2018 4:50:00 PM
31	ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଶୁଖିଲା ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ. ରୁଆ ଧାନ ହେଉଥିବା ଅଂଚଳରେ ହେକଟର ପିଛା ୨୦-୨୫ କେ.ଜି. ହିସାବରେ ଧନିତା ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8197 Advisory Date :-6/26/2018 4:15:47 PM
32	କାକୁଡ଼ି ଓ କଲରା ଫସଲରେ ଫଳ ମାଛିର ଦମନ ପାଇଁ ୨ ମି.ଲି.ସେଭିନ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5531 Advisory Date :-6/28/2018 11:44:07 AM
33	ବର୍ଷାଦିନେ ଛେଳିମାନେ ପି.ପି.ଆର. ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି. ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଓ ନିମୋନିଆ. ତେଣୁକରି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ. ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3646 Advisory Date :-6/28/2018 12:08:29 PM
34	ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଭକ୍ଷଣିଆ ପୋକର ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ମି.ଲି.ଏଥିଅନ କିମ୍ବା ୪୦୦ ମି.ଲି. କାର୍ବୋସଲଫାନ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରାଫସ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5532 Advisory Date :-7/5/2018 11:59:59 AM
35	ସଅଳ କିସମ: ଯୋଗେଶ, ସିକାଡ଼, ମନ୍ଦାକିନି, ଜୋର୍ଡିମୟୀ, ସହଭାଗୀ ଧାନ ମଧ୍ୟମ କିସମ: ହିରଶୁୟୀ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ମନସ୍ୱୀନି, ଏମ୍.ଟି.ୟୁ ୧୦୦୧, କୋଣାର୍କ, ନବୀନ, ଏମ୍.ଟି.ୟୁ ୧୦୧୦ ବିଳମ୍ବ କିସମ: ପୁଜା, ଜଗବନ୍ଧୁ, ମହାନଦୀ, ରାଣୀଧାନ
	Total No of Farmer : - 8199 Advisory Date :-7/5/2018 12:05:30 PM
36	ବୁଣାଧାନରେ ପାଇରାଜୋସଲଫୁରନ ଘାସମରା ଔଷଧ ଏକର ପ୍ରତି ୮ଗ୍ରାମ ୩୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଜା ହେବାର ୭ଦିନ ବେଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପରେ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ବେଳକୁ ବିସପାଇରିବାକ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ମି.ଲି. ଘାସର ୨-୩ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 8197 Advisory Date :-7/6/2018 4:29:18 PM
37	ବାଇଗଣର ଫଳ ପତା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5520 Advisory Date :-7/11/2018 4:37:31 PM
38	କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଇକୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ଦାନ ସହିତ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିଅନ୍ତୁ.

	Total No of Farmer : - 3646      Advisory Date :-7/11/2018 4:25:05 PM
39	ତଳି ଘରାରେ ବାଦାମୀ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଓ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ମାଙ୍କୋଜେବ ୭୫ ଡବ୍ଲୁ.ପି. ପାଣି ଲିଟର ପିଛା ୨.୫ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ମହିଷା ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲେ ଗ୍ରୀକ୍ସାଇକଲୋଜୋଲ ପାଣି ଲିଟର ପିଛା ୦.୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8187      Advisory Date :-7/10/2018 5:28:48 PM
40	କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଈକୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ଦାନ ସହିତ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3646      Advisory Date :-7/11/2018 4:25:05 PM
41	ବାଇଗଣର ଫଳ ପତା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5520      Advisory Date :-7/11/2018 4:37:31 PM
42	ଧାନ ତଳିଘରାରେ ପ୍ରତି ୧୦ଡେସିମିଲ୍ ପାଇଁ ୨୦୦ଗ୍ରା ଫୋରେଟ୍ କିମ୍ବା ୧୨୦୦ଗ୍ରା କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଶାଜି କିମ୍ବା କାର୍ଗାଫ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ଜି ୮୦୦ଗ୍ରା ଦାନାଦାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳି ୩ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 84312      Advisory Date :-7/27/2018 3:18:21 PM
43	ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଥର କାଦୁଅ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫ ଟନ୍ ସଜା ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ , ୪୦ କି.ଗ୍ରା ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 8198      Advisory Date :-8/3/2018 1:02:52 PM
44	ନରସେରୀ ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖାଇ, ହଳକରି ୩-୪ ଫୁଟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ. ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଗୋବର, ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ବାଦାମ ପତ୍ରା ଓ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ସୁପେର ସାରକୁ ମିଶାଇ ଯାଆଁଳା ଛାଡିବାର ୨ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 1407      Advisory Date :-8/3/2018 1:22:59 PM
45	ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ତଳି ଚେରକୁ ୧ଲି ପାଣିରେ ୧.୫ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡାଜିମ (ବାଭିଷ୍ଟିନ)+ ୧.୫ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟମାଇସିନ+ ୧୦ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ୍ ଦ୍ରବଣରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ବୁଡାଇ ରଖି ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଲଗାଇଲେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 5531      Advisory Date :-8/3/2018 1:31:58 PM
46	ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ପନିପରିବାରେ ମୂଳ ପତା ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ଏହାର ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ରୀଡୋମିଲ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5531      Advisory Date :-8/8/2018 4:41:52 PM
47	ଚିନାବାଦାମ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 8187      Advisory Date :-8/8/2018 5:02:33 PM
48	ପାମାରୋଜା ଓ ଲେମ୍ବୁ ଘାସର ତଳି ଉପାଡି ଧାଡିକୁ ଧାଡି ୨ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୧.୫ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଗିଡ଼ା ଜମିରେ ପଶି ତିଆରି କରି ଲଗାନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 8201      Advisory Date :-8/20/2018 4:07:25 PM
49	ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଡାଖୁସା କରି ସାର ଓ ଖତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 5531      Advisory Date :-8/20/2018 4:12:28 PM

50	ମକା ଫସଲରେ ଲେଡା ପୋକର ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରୋଫେନୋଫସ ୫୦% ଇ.ସି. କିମ୍ବା କଲୋରପାଇରିଫସ ୫୦% ଇ.ସି. + ସାଇପରମେଥ୍ରୀନ ୫୦% ଇ.ସି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଅପରାନହରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37454 Advisory Date :-8/23/2018 11:21:03 AM
51	ଧାନ କିଆରୀରେ ନଳୀ ପୋକ ପାଇଁ କିଆରୀର ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ବା ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଗଛକୁ ଜୋରରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଲେ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ. ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ.
	Total No of Farmer : - 37440 Advisory Date :-8/28/2018 10:27:03 AM
52	ସଫନ ମାଛ ଚାଷରେ ଭାକୁର, ରୋହୀ, ମିରିକାଳୀ ୩:୪:୩ ଅନୁପାତରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡା ଯାଆଁଳା (୫୦ ଗ୍ରାମରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ) ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3464 Advisory Date :-8/28/2018 10:38:15 AM
53	ସମ୍ଭାବିତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ନିରୂପଣ କରିରଖନ୍ତୁ. ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଇବାପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ. ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ବୁଟିଙ୍ଗ ପାଉଁଶର ରଖନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 11896 Advisory Date :-8/30/2018 12:02:49 PM
54	ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ କିଆରୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ. ଜବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପରିମାଣ ୬୦କି.ଗ୍ରା./ହେ. ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ. ନିମ୍ନ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ସହ ପାଇମେଟରୋଜେନ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ/ ହେ. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37440 Advisory Date :-9/4/2018 1:03:16 PM
55	ଫସଲକୁ ନଳୀ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. କଲୋରୋପାଇରିଫସ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫସ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37440 Advisory Date :-9/5/2018 10:11:31 AM
56	ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଘାସ ଚାଷ କରି ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସବୁଜ ଘାସ ଦିଅନ୍ତୁ. ଗୁହାଳକୁ ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ସହ ରୂନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 11896 Advisory Date :-9/5/2018 10:16:33 AM
57	ଅଭାବୀ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରୁଆ ଧାନରେ ଅନାବନା ଘାସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ. ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିସପାଇରିବାକ ସୋଡ଼ିଅମ ଏକର ପିଛା ୧୨ ଗ୍ରାମ ଧାନ ରୋଇବାର ୨୦-୨୧ ଦିନ ବେଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37440 Advisory Date :-9/10/2018 12:34:40 PM
58	ପନିପରିବାରେ ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେଭ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 22360 Advisory Date :-9/10/2018 12:49:53 PM
59	ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପୋଖରୀରେ ଏକର ପିଛା ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. କଞ୍ଚା ଗୋବର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ଏହାର ୫ ଦିନ ପରେ ଏକର ପିଛା ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ଏହାର ୩ ଦିନ ପରେ ଯାଆଁଳା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3464 Advisory Date :-9/10/2018 12:57:28 PM
60	ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ଥିବାରୁ ପନିପରିବାରେ ଶୋଷକ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ. ଏହାର ନିଅନ୍ତଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ସୋପ୍ରିଡି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 22359 Advisory Date :-9/18/2018 1:29:59 PM
61	ମକା ଓ ହରଡ଼ରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୋଡାଖୁସା କରି ଶୀର୍ଷ ସାର ଦେଇ ମୂଳକୁ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ. ଧାନ ଫସଲରେ ଥୋଡ ସାର (ଇଉରିଆ ସାର) ଦେଇ ୪୮ ଘଣ୍ଟା କିଆରୀରେ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37449 Advisory Date :-9/18/2018 1:40:39 PM

62	ପୋଖରୀରେ ଦ୍ରଞ୍ଜିଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ କମ ହୋଇ ମାଛ ପାକୁ ପାକୁ ହୋଇ ଭାସି ମରୁଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୫ ଫୁଟ ଜଳ ଗଭୀରତା ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଜିଓଲାଇଟକୁ ଏକ ବସ୍ତା ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ଗୋଳାଇ ପୋଖରୀରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3463      Advisory Date :-9/18/2018 1:49:45 PM
63	ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିଛା ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ କାରଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜୋରାଇଡ୍ ୪% ଦାନାଦାର ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୮.୭୫କି.ଗ୍ରା.ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରାୟାଜୋଫସ୍ + ଡେଲ୍ଟାମେଥଲିନ ୨ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୭ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 37453      Advisory Date :-9/25/2018 10:28:23 AM
64	ଭେଣ୍ଟି ଫସଲରେ ସାହେବି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 22359      Advisory Date :-9/25/2018 10:39:46 AM
65	ରୁଆ ଧାନରେ ପତ୍ରଛଦ ପୋଡା ରୋଗ ନିମିତ୍ତ ଥାଇଫୁଜୋମିଡ୍ / ଡିଫେନକୋନାଜୋଲ ୧ ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37439      Advisory Date :-9/29/2018 10:18:59 AM
66	ଚକଡା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପାଇମେଟରୋଜାଇନ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37454      Advisory Date :-10/6/2018 2:59:31 PM
67	ଦିନ ଓ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ଥିବାରୁ ପନିପରିବାରେ ଶୋଷକ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ. ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 22371      Advisory Date :-10/6/2018 3:06:30 PM
68	ଧାନ ଫସଲରେ ମୂଳସତ୍ତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ କିଆରୀରୁ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ କିମ୍ବା ଭାଲିଡାମାଇସିନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ସାମୟିକ ଭାବେ ଯୁରିଆ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37440      Advisory Date :-10/12/2018 12:00:58 PM
69	ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବାଦାମ ପିଡିଆ ଓ ଧାନ ଗୁଣ୍ଡ ସମାନ ଅନୁପାତରେ (୧:୧) ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ମାଛ ଶରୀର ଓଜନର ୫-୭ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ. ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟକୁ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 3464      Advisory Date :-10/12/2018 12:09:55 PM
70	ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଠିଆ ଫସଲରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପଲ ରବି ପନିପରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲର ବୁଣାବୁଣି ଦେଖି ରାହିଁ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 70115      Advisory Date :-10/12/2018 12:56:13 PM
71	ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ବା ଚକଡା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ୬ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାହି ତିଆରି କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37440      Advisory Date :-11/1/2018 11:12:31 AM
72	ଭେଣ୍ଟିରେ ଫୋଟକା ରୋଗ ଓ ଶୋଷକ ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ୧ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ପ୍ରତି ୧ ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 22360      Advisory Date :-11/1/2018 11:50:55 AM
73	ଧାନରେ ବାଦାମୀଗୁଣ୍ଡି ପୋକ କିମ୍ବା ଧଳା ବା ସବୁଜ ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପିଛା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮ଏସ୍.ଏଲ୍. ୫୦ ମି.ଲି କିମ୍ବା ନିମ୍ଫ ଡେଲ ୫ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଶତକଡା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.

	Total No of Farmer : - 37454    Advisory Date :-11/2/2018 10:39:56 AM
74	ପନିପରିବା ଓ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦ ଗ୍ରାମ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କିମ୍ବା ଥାୟମେଥୋକସାମ ୪୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ ୨୦% ଏସ୍.ପି. ୫୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 22371    Advisory Date :-11/5/2018 11:37:05 AM
75	ଗାଈ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ଗୁହାଳକୁ ସକ୍ତସକ୍ତିଆ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯଥା: ଗାଈର ପୁନହରା, ଛେଳିର ଖୁରସଡ଼ା, ମେଣ୍ଟାର ଚମଡ଼ା ଘା, ଦସିପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗର ବାହକ ହୋଇଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 11895    Advisory Date :-11/5/2018 11:57:09 AM
76	ଧାନର କ୍ଷୀର ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ୧.୫% ଗୁଣ୍ଠ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ବିଞ୍ଚନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଲାଥିଅନ ୫୦% ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସକାଳ ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 37454    Advisory Date :-11/6/2018 12:10:39 PM
77	ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, ବରଗୁଡ଼ି ଆଦି ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିଲେ, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ସଲଫର୍ ୮୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି. ୫୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କାରବେଣ୍ଡଜିମ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37440    Advisory Date :-11/15/2018 10:28:02 AM
78	ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ସହ ୨୫ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ମୂଳ ଭାଗକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 22360    Advisory Date :-11/15/2018 10:48:26 AM
79	ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଣୀ, ବଜବଜିଆ, ଫାଟୁଆ ଓ କୁଡୁଡା ବସନ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 11895    Advisory Date :-11/15/2018 11:06:17 AM
80	ଧାନ ଫସଲରେ ବିଜାଶୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ (BLB ) ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ + ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ୨୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 37440    Advisory Date :-11/22/2018 10:35:19 AM
81	କୋବି ଫସଲକୁ ଧୂଆଁ ଗୋଟି ପୋକର ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ମୁକ୍ତ ଔଷଧ ୫ ମି.ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ. ୨ ରୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରିନୋସାଡ଼ ୨ ମି.ଲି. ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 22371    Advisory Date :-11/22/2018 10:45:28 AM
82	ପ୍ରତିଦିନ ବାଛୁରୀକୁ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ ଓ ବଡ଼ ବାଛୁରୀକୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ. ଦୁଧିଆଳୀ ଗାଈକୁ ୧୦୦-୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଭଲ.
	Total No of Farmer : - 11895    Advisory Date :-12/6/2018 10:53:08 AM
83	ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ପୋଖରୀରେ ୪୦ ଗ୍ରାମ ତୁନ ସହ ୪ କି.ଗ୍ରା. ହଳଦୀଗୁଣ୍ଠ ମିଶାଇ ଦୁଇଟି କିସ୍ମିରେ ଏକ ମାସ ଅନ୍ତରରେ ପକାଇଲେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ.
	Total No of Farmer : - 3464    Advisory Date :-12/6/2018 11:44:18 AM
84	ଚିନାବାଦାମ ଚାଷରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ମୂଳ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ. ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37450    Advisory Date :-12/6/2018 11:54:45 AM

85	ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିରେ ବତର ଦେଖି ଶୀଘ୍ର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ. ଶେଷ ଓଡ଼ ହଳ ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପସମ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 37451 Advisory Date :-12/12/2018 11:07:04 AM
86	ଭେଣ୍ଟିରେ ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୧୫୦୦ ପି.ପି.ଏମ. ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
	Total No of Farmer : - 22371 Advisory Date :-12/12/2018 11:26:26 AM
87	ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ୧) କଟାଯାଇ ନଥିବା ଧାନକୁ କାଟି ବିତା କରି ଖଳାରେ ଚାରପୋଲିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ୨) ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ବେଙ୍ଗଳା କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 37451 Advisory Date :-12/13/2018 11:33:38 AM
88	ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀନୋସାଡ଼ ୪୫% ଏସ୍.ସି. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଙ୍ଗୋଏଡ଼ ୫% ଏସ୍.ଜି. ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
	Total No of Farmer : - 37440 Advisory Date :-12/17/2018 11:47:44 AM
89	ପନିପରିବା ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ରଞ୍ଜାରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଲଗା ଜାତୀୟ ପନିପରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ରଞ୍ଜା ମୂଳକୁ ମାଟି ଦେଇ ଶକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 22371 Advisory Date :-12/17/2018 11:58:46 AM
90	ତଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଧାନ ଜମି ଓ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମୁଗ, ବିରି, ବୁଟ, ମଟର, କୋଳଥ ଆଦି ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 37450 Advisory Date :-12/18/2018 10:42:59 AM
91	ପନିପରିବା ତଳିରେ ମୂଳପତା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ଼ ମିଶାଇ ମାଟି ଓ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 22360 Advisory Date :-1/3/2019 3:12:16 PM
92	ଶୁଖିଲା ପାଗର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ୩-୪ ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 37452 Advisory Date :-1/3/2019 3:16:16 PM
93	ଧାନ ଅମଳ ପରେ ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ମାଟିର ବତର ଥିବା ସମୟରେ ଚାଷ କରି ମୁଗ କିମ୍ବା ବିରି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 37451 Advisory Date :-1/5/2019 11:15:11 AM
94	ସ୍ତନହରା ରୋଗ ଠାରୁ ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପହୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ଗାଈକୁ କିଛି ଦାନା କିମ୍ବା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
	Total No of Farmer : - 11895 Advisory Date :-1/15/2019 10:17:45 PM
95	ଫୁଲକୋବି ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଓ ମସୃଣ ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାରା ଲଗାଇବାର ୨୦ ଦିନ, ୩୫ ଦିନ ଓ ୫୦ ଦିନରେ ବୋରନ ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 22370 Advisory Date :-1/15/2019 10:27:52 PM
96	ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ୧୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ ୨୦ ଗ୍ରାମ, ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
	Total No of Farmer : - 37454 Advisory Date :-1/15/2019 10:35:56 PM