

ଜଳସେଚନ : ଶରାଦିନେ ୪ ରୁ ୫ ଦିନରେ ଥରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖି ପସ୍ତାହରେ ଥରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ ।
ବଂଶବିସ୍ତାର : ମଞ୍ଜିରୁ ଓ କଟା କରମି ଦ୍ୱାରା ଗେଣ୍ଡୁର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ଅମଳ : ଫୁଲର ଆକାର ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ । ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ଅମଳ ବଢ଼ିଥାଏ । ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ପିବା ସମୟରେ ହିଁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଦରକାର । ପାଣି ଦେବାର ଦୁଇଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେଶି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଜା ରହେ । ଏକର ପ୍ରତି ଆଫ୍ରିକାୟ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ୮୦ ରୁ ୮୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓ ଫରାସୀ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ୪୦-୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜଫୁଲ ଅମଳ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇମିନିୟମ୍ ସରଫେଟ୍ (୧ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣି)ରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ଅଧିକ ଦିନଯାଏଁ ସତେଜ ରହେ ।

ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲସ୍ ଚାଷ

ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲସ୍ କଟାଫୁଲ ହିସାବରେ ଓ ଫୁଲ ଚୋଡ଼ା ବିଆରିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କଟାଫୁଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଷ କଲେ ଏହି ଫୁଲରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ।

ମୂଲିକା : ନିଗଡ଼ା, ଭର୍ବର ଓ ଚୋରସା ଏବଂ ଅମୃତା ୬ ରୁ ୭ ।

କିସମ : ଶ୍ରୀଗଣେଶ, ପିଟର ପିଅର୍ସ, ବୁକକାକ, ଚେରୀ ରୁସମ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍‌ପିସ୍, ହାପି ଏଣ୍ଡ, ହୁଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନିରେଖା, ଆପଲ କୁସମ୍, ଆରଚୀ, ଅପସରା, ଗୋରା, ମାଘା, ପୁନମ୍, ରେଡ୍ ବିଭର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ।



ବିତନ ଓ ବିଶୋଧନ : ଧନକନ୍ଦ (ଫୁଲ ପାଇଁ), ଭପକନ୍ଦ (ଧନକନ୍ଦ ପାଇଁ) । ମାନକୋଜେଟ୍ (୩ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) + କାର୍ବେଣ୍ଡାକିମ୍ (୧ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) ।

ବିତନ ପରିମାଣ : ଗୋଟିଏ ବେଡ୍‌ରେ ୨୫୦ଟି କର୍ମ୍ ଲାଗିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ୧୬୦ ଟି ବେଡ୍ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ୪୦,୦୦୦କର୍ମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ।

ବଂଶ ବିସ୍ତାର : ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲସ୍ ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କର୍ମ୍ ବା ଧନ କନ୍ଦରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ୪ ଘେ.ମି. ବା ତା ଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଧନକନ୍ଦ ଓ ଭପକନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ

ଅମଳ ପରେ ନିଷ୍ପିୟ ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲଗାଇଲେ ଗଜା ଦୁଏ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ୩-୪ ମାସ ଯାଏ ୪-୫ ଡିଗ୍ରୀ ଘେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପରେ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ଇଥେଲ୍ (୧ଗ୍ରାମ୍/ଏକ ଲିଟର ପାଣି) କିମ୍ବା ଜିଏ (୦.୧ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ପାଣି) ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ଦୁଏ । କନ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ତଳ ଅଂଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେର ବାହାରିବାର ଦେଖାଗଲେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଗାହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭପର ଗୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଶତକଡ଼ା ୦.୨ ଭାଗ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ (୨ଗ୍ରାମ୍ ଔଷଧ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ)ର ଦ୍ରବଣରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର ।
ଭୋପଣ ସମୟ : ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ଡିସେମ୍ବର ।


କର୍ମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି : ଗୁଣ୍ଡତାପ, ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ ଟନ କରଖ୍ ।
ଲଗାଇବା ଦୂରତା : ୨୦-୩୦ x ୧୫-୨୦ ଘେ.ମି.

କନ୍ଦ ଲଗାଇବା : ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ୫ ଘେ.ମି. ଗରୀରରେ ।
ସାର ପ୍ରୟୋଗ : ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପିଆର ତଳେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୬୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ଫୋରସ୍ ଏବଂ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସିୟମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ତିନିପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଛଅପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଲେଖାଏଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ପରବର୍ଣ୍ଣି ଯତ୍ନ : କାଠି ଯୋଡ଼ି ଗଛକୁ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ । ପତ୍ର ଆଗଆଡ଼ ଶୁଖି ଆସିଲେ ତୁନ(୫୦ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ଅମଳ : ଫୁଲକେଣ୍ଡା ବା ଛଡ଼ିର ତଳ ଫୁଲଟିରେ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ଆସିବା ପରେ ବା ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲିବା ପରେ ଧାଇବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଛୁରା ପାହାଘ୍ୟରେ ମୂଳରୁ କାଟି ଅମଳ କରାଯାଏ । ଏକ ଏକରରୁ ୪୦,୦୦୦ ଧାଇବ୍ ବା ଫୁଲକେଣ୍ଡା ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଫୁଲକେଣ୍ଡା ଅମଳ ହେବାର ୬ ରୁ ୮ ସପ୍ତାହ ପରେ ଧନକନ୍ଦ ଅମଳ କରାଯାଏ । ଅମଳ ହେବାର ୨/୩ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ସେଚନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର । ଗଛରେ ପତ୍ର ସଂକଟିଆ ହୋଇ ଆସିଲେ ଧନକନ୍ଦ ପାକଳ ହେବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ମାଟିରୁ ଖୋଳାଯାଇ ଏକ ସପ୍ତାହ ଶୁଖାଯାଏ । ଏହାପରେ ଶତକଡ଼ା ୦.୨ ଭାଗ ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ର ଦ୍ରବଣରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ଛାଇରେ ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଶୁଖିବା ପରେ ପରିଷ୍କୃତ ମୁଣି ବା ଅଖାରେ ମୁଲାଇ ଶୀତଳ ଉଷ୍ଣାଋରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ କିସମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କର୍ମ୍ ସହିତ ୧୬ ରୁ ୨୦ ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ କର୍ମ୍ ମିଳି ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫୁଲଚାଷ



ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ବେହେରା
 ବିଶେଷଜ୍ଞ (ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି)



କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଗୋଳ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ

ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଲାପ, ସେବତୀ, ବ୍ରାହ୍ମାଲିଆ, ଗେଣ୍ଡୁ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ମଲ୍ଲୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଯୁଲ, ହେନା, ସୁଗନ୍ଧାବାଳ, କିଆ ଆଦି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଫୁଲ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ପୁନା ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରୁ ଆଣାଣୀତ ଭାବେ ବିଦେଶକୁ ଫୁଲ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାରଣ ବିଦେଶରେ ଫୁଲର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ରହିଛି। ନିମ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କେତୋଟି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା।

ଗୋଲାପ ଚାଷ

ଗୋଲାପକୁ ସୌଖିନ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରି ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭକାରୀ କରୁଛନ୍ତି।
ମୂଲିକା : ଦୋରସା, ବାଲିଆ ଦୋରସା ଓ ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ।
ଅମୃତା : ୬ ରୁ ୭.୫।

କିସମ : ଗୋଲାପକୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ।
 (୧) ହାଇଡ୍ରାଟ୍ (୨) ଫ୍ଲୋରିବୁଣ୍ଡା (୩) ପଲିଏନ୍ଡା (୪) ଛୋଟ ଗୋଲାପ (୫) ଲଟା ଗୋଲାପ।



ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗୋଲାପଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାଷ୍ଟରେଡ଼, ସାମାରାଇ ଟେନିସ୍, ଆସ୍ତା, ସୁପର ଷ୍ଟାର, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏବଂ କୁଲନ ଏଲିଜାବେଥ।

ବଂଶ ବିସ୍ତାର : ପ୍ରଜନନକାରୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ୍ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ କିସମର ଗୋଲାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଡାକ କଲମି, ମାଟି କଲମା, ଗୁଡି କଲମି ଏବଂ ଯୋଡ଼ କଲମା ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମୁକୁଳ / ଆଖି କଲମା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଛି।
ଦୂରତା : ଡେଙ୍ଗା ୧ମି. x ୧ମି., ମଧ୍ୟମ- .୭୫ x .୭୫ମି. ଏବଂ ଛୋଟ .୫୦ x .୫୦ ମିଟର।

ଖାତର ଆକାର ଓ ଲଗାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ : ୦.୫ x ୦.୫ x ୦.୫ ମିଟର। ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାପ ଲଗାଇବାର ଉତ୍ତୁଷ୍ଟ ସମୟ।

ବିଦନ : ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବଳ ଆଖି କଲମି ଚାରା, ଗୁଡି କଲମି ଚାରା ବା ଗଛ ଖଣ୍ଡ ଚାରା।

ଖତ ଓ ସାର (ଗଛପ୍ରତି) : ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର ଖତ ୧ ଟୁଡ଼ି, ପିଡ଼ିଆ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ୩୦ ଗ୍ରାମ, ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ, ସୁଫର୍ ଫସଫେଟ୍ ୧୨୫ ଗ୍ରାମ ଓ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ୩୫ ଗ୍ରାମ, ବଂ ଲଗାଇବା ପରେ ଗୋବର ଖତ ୧ ଟୁଡ଼ି, ପିଡ଼ିଆ ୩୦ ଗ୍ରାମ, ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ୩୦ ଗ୍ରାମ, ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ୨୫ ଗ୍ରାମ, ସୁଫର୍ ଫସଫେଟ୍ ୧୨ ଗ୍ରାମ ଓ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ୨ ଗ୍ରାମ ହେବା ଉଚିତ୍।

ଜଳସେଚନ : ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ।
ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ : ଯୋକ-ଭଲ : ୫ ଗ୍ରାମ କୋରାପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ।
ଅମଳ : ଗଛ ଲଗାଇବାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ ଫୁଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ ଟି ଫୁଲ ମିଳେ। ସକାଳୁ ଚାଣ ଖରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଏ। ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ସିକେଟର୍ ବା ଫୁଲକଟା କଲଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ରଜନୀଗନ୍ଧା ଚାଷ

ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ଫୁଲର ଆଦର ଦେଖି, କାରଣ ଫୁଲ ତୋଳା, ଫୁଲଦାନି ସଜାଇବା ଏବଂ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ୩/୪ ଦିନ ଫୁଲଦାନିରେ ରହେ। ଖୁବ୍ ବାସ୍ତାୟୁକ।

ମୂଲିକା : ନିଗିଡ଼ା, ବାଲିଆ ଓ ଦୋରସା। ଅମୃତା ୬.୫ ରୁ ୭.୫।
ଲଗାଇବା ଦୂରତା : ୩୦ ସେ.ମି. x ୨୦ ସେ.ମି.।
ଲଗାଇବା ସମୟ : ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ବିଦନ : ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଲା ବା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଚାରା।
କିସମ : ରଜନୀଗନ୍ଧା କିସମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା- ସିଙ୍ଗଲ୍, ଡବଲ୍ ଓ ଅର୍ଡ଼ ଡବଲ୍ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କିସମ ହେଲା କଲିକତି ସିଙ୍ଗଲ୍, ସୁଭାସିନୀ, ମୁଖା, କଲକତି, ଡବଲ୍, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ରଜତରେଖା।

ଜଳସେଚନ : ଜମିର ବତର ଦେଖି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର।
 ତେବେ ୬/୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଓ ୪/୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଖରାଦିନେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ।



ଖତ ଓ ସାର : ଏକ ବର୍ଗ ମିଟର ପରିମିତ ଜମିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ।

ଅମଳ : ରଜନୀଗନ୍ଧା କମ ଲଗାଇବାର ୧୫୦ ରୁ ୨୪୦ ଦିନ ପରେ କମ ସାଇକ୍ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏକର ପ୍ରତି ୨୫ ରୁ ୩୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଫୁଲ ମିଳିଥାଏ। ୨ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ୪୦ ରୁ ୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଓ ୩ ବର୍ଷରେ ୨୦ ରୁ ୨୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଫୁଲ ମିଳେ। ସାଧାରଣତଃ ଫସଲର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପରେ କମ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଏକ ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ କମ ଅମଳ ହୁଏ।

ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଏହାର ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରୁଛି।

ମୂଲିକା : ଗେଣ୍ଡୁ ସହଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ମାଟି ଖୁବ୍ ଉର୍ବର, ଫସଫସିଆ, ଅଧିକ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା, ନିଗିଡ଼ା ତଥା ସମଭାବାପର୍ଣ୍ଣ (ଅମୃତା ୬ ରୁ ୭.୫) ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

କିସମ : ଗେଣ୍ଡୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଫରାସୀ ଗେଣ୍ଡୁ।



ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କିସମ ହେଲା ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅରେଜ୍/ୟେଲୋ, ଲନକା ଅରେଜ୍/ୟେଲୋ/ରେଡ୍, ହନିକୁମ୍ପ, ବଟରସ୍ପଟ ଏବଂ ହାପି ଅରେଜ୍/ୟେଲୋ।

ଗଛ ଲଗାଇବା ଦୂରତା : ଗଛକୁ ଗଛ ୩୦ ସେ.ମି ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪୫ ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ଉପରଦେଲା ଲଗାଯାଏ।
ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟ : ଜୁନ-ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ନାନ୍ଦୁୟାରୀ-ଫେବୃୟାରୀ।

ଖତ ଓ ସାର : ହେକ୍ଟର ପିଛା ଯବକ୍ଷାରଜାନ-୧୦୦ କି.ଗ୍ରା, ଫସଫରସ୍-୨୦୦ କି.ଗ୍ରା, ପଟାସ୍-୨୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଗଛ ଲଗାଇବାର ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଧା, ସମ୍ଭବ୍ୟ ଫସଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ସାର ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ମାସ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।