

ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଥା ସିପ୍ରୋଫ୍ଲକ୍ସାସିନ୍, ଏନ୍‌ରୋଫ୍ଲକ୍ସାସିନ୍, ଆମୋକ୍ସିସିଲିନ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ୍ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସଂକ୍ରମିତ ଛେଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିଯାଇଥାଏ ।

ଛେଳି ବସନ୍ତ : ସମସ୍ତ ବୟସର ଛେଳିଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗରେ କୂର ହୁଏ, ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡେ, ଚୂନ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ଫୋଟକା ହୋଇଥାଏ ।



ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ ମାତ୍ର ନାକ, ଆଖି ଆଦି ସ୍ଥାନର ଘା'କୁ ପଟାସ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ପାଣି (୧ : ୧୦,୦୦୦)ରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଛେଳି କିଛି ଖାଉନଥିଲେ ୧୦% ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ପରଜୀବୀ ରୋଗ

ଅନ୍ତଃ କୃମି : ଗୋଲ କୃମି, ଫିତା କୃମି, ପତ୍ର କୃମି, ରକ୍ତଶୋଷଣକାରୀ କୃମିମାନ ଶରୀରରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଛେଳି ଭଲ ବଢେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ବର୍ଷକୁ ତିନିରୁ ଚାରିଥର କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃକୃମିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ (୧)ଦୁଇ ମାସର ଛେଳିଛୁଆଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଆ ମାରିବା ଔଷଧ ଦେବା ଉଚିତ୍ । (୨) ଚାରି ମାସର ହୋଇଗଲେ ପତ୍ରକୃମି, ପାକପୁଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତକ୍ତ କୃମି ଔଷଧ ଦିଆଯିବ । (୩) ବର୍ଷାଦିନ ଶେଷରେ ଗୋଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛେଳିଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ୍ । (୪) ଶୀତଋତୁ ଶେଷରେ ପୁଣିଥରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।



ଗୋଲ କୃମି ଫିତା କୃମି ପତ୍ର କୃମି

ବାହ୍ୟ କୃମି : ଟିକ୍ ଓ ଉକୁଣା ଦେହରେ ଲାଗିରହି ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି ଓ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚୂଟାଣ, କାନୁ ଓ ଛେଳି ଦେହକୁ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ । ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ ଔଷଧ ଯେପରି ନାକ, ଆଖି ଓ ପାଟିରେ ନପଡିବ ତା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସିଞ୍ଚନ ପରେ ଛେଳିକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଛାଇରେ ରଖିବା ପରେ ଭଲଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଅର୍ଥନୀତି

ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ, ପରିବେଶ ଓ ଛେଳି ମଂସର ଚାହିଦାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଛେଳିପାଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତି ଉନ୍ନତ । ଉତ୍ତମ ଚାରଣ ଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ଟ.୧୨୦୦-୧୪୦୦ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ କିମ୍ବା ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ହାରାହାରି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଏଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳରେ ଛେଳି ପାଳନ ଏକ ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।



ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନୁଗୋଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।




ଭୂମିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ

ଛେଳି ପାଳନ



ଡଃ. ମୋନାଲିସା ବେହେରା
 ବୈଜ୍ଞାନିକ (ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ)
 ମୁଖ୍ୟ ସଂପାଦିକା
 ଡଃ. ବିନୀତା ଶତପଥୀ
 ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୋଳ

ଗୋପାଳନ ଭଳି ଛେଳିପାଳନ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଛେଳି ସବୁପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ଏବଂ ଡାଳପତ୍ର, ବାଡିବଗିଚାର ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ, ରୋଷେଇଶାଳାର ବର୍ଜ୍ୟ ପନିପରିବା ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ପାଳକର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ଅନିୟମିତତା ହେତୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏଣୁ ଭୂମିହୀନ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀ ଛେଳିପାଳନ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ । କୁକୁଡ଼ା ତୁଳନାରେ ଛେଳି ମାଂସର ଚାହିଦା ବର୍ଷତମାମ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ।

ଛେଳିର କିସମ

ଆମ ଦେଶରେ ୨୦ କିସମର ଛେଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ କିସମର ଛେଳି ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଯଥା- ବ୍ଲୁକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଓ ଗଞ୍ଜାମ । ଏମାନେ ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ବ୍ଲୁକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍ ବୟସ୍କ ଛେଳିର ଓଜନ ହାରାହାରି ୧୫-୧୬ କି.ଗ୍ରା । ମାଛ ଛେଳି ଥରକେ ୨ରୁ ୩ଟି ଛୁଆ ପ୍ରସବ କରିଥାଏ । ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳିର ଶିଙ୍ଗ ଲମ୍ବା ଓ ପଛ ଆଡକୁ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ । ବୟସ୍କ ଛେଳିର ଓଜନ ୧୮ରୁ ୨୨ କି.ଗ୍ରା. ହୋଇଥାଏ । ମାଛ ଛେଳି ଥରକେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ।



ବ୍ଲୁକ୍ ବେଙ୍ଗଲ୍



ଗଞ୍ଜାମ

ଛେଳିର ବାସଗୃହ

ଆମ ଜଳବାୟୁରେ ବାସଗୃହର ଲମ୍ବ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ୍ । ବୟସ୍କ ମାଛ ଛେଳି ପିଛା ୧୨ ବର୍ଗ




ଫୁଟ, ବୋଦା ପିଛା ୩୦ ବର୍ଗଫୁଟ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ବର୍ଗଫୁଟ ଚଟାଣ ଯାଗା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଘରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଦୁଇଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ବାଉଁଶ ଭାଡି ତିଆରି କରି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲାରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ଘରର ଛାତ ଆଇବେଷ୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ଟିଣ ଅପେକ୍ଷା ଚାଳ ଛପର କରିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ଛେଳିର ଖାଦ୍ୟ

ବର, ଅଶ୍ୱତଥୁ, ସୁବାଗୁଲ, ମହାନିୟ, ପିପଲି, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବରକୋଳି ଇତ୍ୟାଦି ଗଛର ପତ୍ର ଛେଳି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ଅଧିକା ଛେଳି ରଖିଲେ ବର୍ଷାଦିନେ ବରଗୁଡ଼ି, ମକା, ନାପିଅର ଓ ଶୀତଦିନେ ବରସିମ୍ ଘାସ ଚାଷ କରି ଛେଳିକୁ ଦେଇପାରିବେ । ଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ର ଅଭାବ ସମୟରେ ଗର୍ଭିଣୀ ଛେଳିକୁ ଦାନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।

ସୁସମ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

- ଉପାଦାନ ପରିମାଣ
- ମକାଗୁଣ୍ଡ - ୫୦ ଭାଗ
- ଗହମ ଚୋକଡ - ୩୦ ଭାଗ
- ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ - ୧୦ ଭାଗ
- ଗୁଡ - ୭ ଭାଗ
- ଖଣିଜସାର - ୨ ଭାଗ
- ଲବଣ - ୧ ଭାଗ
- ମୋଟ - ୧୦୦ ଭାଗ



ଛେଳିମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା

ବୟସ	ହାରାହାରି ଶାରୀରିକ ଓଜନ (କି.ଗ୍ରା.)	ମା' କ୍ଷୀର (ମି.ଲି.)	ଦାନା (ଗ୍ରାମ)	ସବୁଜ ଘାସ (ଗ୍ରାମ)
୦-୫ଦିନ	୧-୨	ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ	-	-
୬-୩୦ଦିନ	୨-୩	୩୦୦-୫୦୦	ସ୍ୱଳ୍ପ	ସ୍ୱଳ୍ପ
୧-୨ ମାସ	୩-୫	୪୦୦-୫୦୦	୫୦-୧୦୦	ସ୍ୱଳ୍ପ
୨-୩ ମାସ	୫-୭.୫	୩୫୦-୫୦୦	୧୦୦-୧୫୦	୨୫୦
୩-୪ ମାସ	୭.୫-୧୦	-	୨୦୦-୨୫୦	୫୦୦
୫-୬ ମାସ	୧୦-୧୫	-	୨୫୦-୩୦୦	୭୫୦
୬-୯ ମାସ	୧୫-୨୦	-	୩୦୦-୪୦୦	୧-୨କି.ଗ୍ରା.
ବୟସ୍କ	୨୦-୩୦	-	୨୦୦-୩୦୦	୨-୩କି.ଗ୍ରା.
ଗର୍ଭିଣୀ	୨୫-୩୨	-	୨୦୦-୩୦୦	୨-୩କି.ଗ୍ରା.

ଛେଳିମାନଙ୍କ ରୋଗ

ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଓ ପରଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନରେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉଛି ।

ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ

ଏଣ୍ଟେରୋଟକ୍ସେସିଆ : ଏହି ରୋଗ କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ୍ ଫ୍ରେଲ୍ଡି ନାମକ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ଛେଳିଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବେଶି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା କଳା ଓ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଝାଡା ହୋଇଥାଏ । ପେଟ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଛେଳି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷାଋତୁରେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟେରୋଟକ୍ସେସିଆ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଶାହାଣ : ଏହି ରୋଗରେ



ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ହୋଇଥାଏ । ଗଳା ଫୁଲିଯାଏ, ପାଟିରୁ ଲାଲ ବାହାରେ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛେଳି ମରିଯାଏ ।

ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଶାହାଣ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ

ପି.ପି.ଆର୍. : ଏହି ରୋଗ ସବୁ



ବୟସ୍କର ଛେଳିଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୂତାଣୁ ଛେଳିର ନାକ ଓ ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣି, ମଳ ଓ

ମୂତ୍ର ଆଦିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ । କାଶ ଓ ଜ୍ୱର ହୋଇ ମୁହଁ ଭିତରେ ଘା ହୋଇଥାଏ । ପତଳା ଝାଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଥରେ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏହା ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ । ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ ଔଷଧ ନଥିଲେ